

Crapaud d'Amérique

American toad

Bufo americanus americanus

Ordre : Anoures

Famille : Bufonidés

Description : Corps verruqueux et peau sèche. Coloration variable selon les régions. Les verrues sont en fait des glandes à toxines. Contrairement à la croyance populaire, les verrues ne sont pas transmissibles à l'homme. Lignes pâles traversant le dos. Ventre et poitrine pâles et mouchetés de noir. La femelle rougeâtre lors de la reproduction. Le mâle est plus petit que la femelle et il a la gorge foncée. Vit en forêt et dans les champs, se cache sous la matière végétale et est actif de jour et de nuit. Hiberne dans le sol, il creuse profondément pour ne pas geler.

Alimentation : Petits invertébrés terrestres et rarement, un crapaud plus petit que lui.

Reproduction : Avril et mai. La femelle pond entre 4000 et 7000 œufs en long chapelet dans l'eau, enroulé à la végétation. Éclosent après 2 à 14 jours et sont sous forme de têtard de 5 à 10 semaines.

Prédateurs : La couleuvre rayée, des poissons et des tortues. Les buses et les hérons en mangent. La plupart des mammifères et des oiseaux l'attaquent sans le dévorer à cause de ses toxines. On rapporte que le raton laveur s'en nourrit en le dévorant par le ventre pour éviter les glandes à toxines.

Statut : Non en péril, très commun au Québec. Localement menacé par la fragmentation et la destruction de son habitat et le remblayage des milieux humides.